


Comportamiento de las mujeres sobre el embarazo, parto y uso de métodos anticonceptivos en las comunidades de: Aranjuez, Bijague, Jucuapa Abajo, Jucuapa Centro, Matasano y Palcilas



Realizado por:
Área de salud
Colectivo de mujeres de Matagalpa
Nicaragua – Diciembre 1997

Índice

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
RESULTADOS	4
Distribución de mujeres por comunidades	4
Estado civil	4
Religión	5
Edad	5
Edad de la primera regla	6
Edad primer embarazo	6
Espacio de primer regla y el primer embarazo	7
Número de embarazos	8
Causa de muerte de las hijas/os	9
Lugar de los partos	10
Quién la atendió	10
Uso de métodos anticonceptivos	11
Motivos expresados para no usar métodos de planificación	12
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES	13

Introducción

La situación de la mujer en relación a su etapa reproductiva es un eje de trabajo del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

Normalmente los datos que se disponen sobre esta situación son investigaciones realizadas en otras regiones o en otros contextos.

Es una preocupación del área de salud del Colectivo de Mujeres el ir analizando las situaciones que viven las mujeres con las que trabajamos, y poder comparar con el comportamiento general del país.

La presente investigación se llevó a cabo en las comunidades donde el colectivo desarrolla un trabajo comunitario con las mujeres, parteras y promotoras.

El objetivo de la misma fue identificar el perfil de las mujeres en la comunidad y su comportamiento en su etapa reproductiva.

La muestra fue entrevistar a las mujeres que llegaron a los encuentros en el periodo de octubre y diciembre del 2007.

Para ello se diseñó una guía de preguntas que además facilitara la sistematización de la información. Las entrevistas fueron realizadas por el equipo que desarrolla el programa de trabajo comunitario.

Resultados

Han sido entrevistadas 337 mujeres de 6 comarcas del Municipio de Matagalpa para un total de 34 comunidades.

Distribución de mujeres por comunidades

Comunidad	Jucuapa abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucua. centro	Total
# mujeres	59	39	56	53	48	82	337

Estado civil

Estado civil	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa centro	Total
Solas	7 12%	5 13%	3 5%	13 24%	2 4%	4 5%	34 10%
Casadas	21 35%	23 59%	25 45%	20 38%	19 39%	34 41%	142 42%
Solteras	14 24%	1 2%	6 11%	7 35%	17 35%	19 3%	64 19%
Ajuntadas	17 29%	10 26%	22 39%	13 24%	9 19%	20 24%	91 27%
Viudas					1 2%	5 6%	6 2%
Total	59	39	56	53	48	82	337

El 69% de las mujeres entrevistadas refieren que tienen una relación estable, no se especificó el tipo de apoyo que reciben por parte de los compañeros.

Religión

Entre las mujeres entrevistadas la religión a la que pertenecen, en un 85% es la católica.

Religión	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
Católica	57 97%	38 97%	39 70%	30 57%	47 98%	75 91%	286 85%
Evangélica	0	0	13 23%	9 17%	1 2%	2 2%	25 7%
Creyente	2 3%	0	0	2 4%	0	0	4 1%
Ninguna	0	1 2.5%	4 7%	11 21%	0	4 5%	20 6%
Sin dato	0	0	0	1	0	1	2 0.5%
Total	59	39	56	53	48	82	337

Edad

Edad	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
< 18 a	16 27%	2 5%	10 18%	8 15%	15 31%	24 29%	75 22%
19 a 24	13 22%	14 36%	16 28%	20 38%	9 19%	12 15%	84 25%
25 a 30	9 15%	9 23%	15 27%	7 13%	10 21%	14 17%	64 19%
31 a 35	3 5%	4 10%	4 7%	4 7.5%	2 4%	6 7%	23 7%
>de 35	18 30%	10 26%	11 20%	14 26%	12 25%	26 32%	91 27%
Total	59	39	56	53	48	82	337

El 50% de las mujeres entrevistadas tienen menos de 24 años.

Edad de la primera regla

Edad 1ª regla	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
Antes 12	0	1 2.5%	3 5%	0	1 2%	0	5 1%
12	7 12%	3 8%	6 11%	12 23%	9 19%	9 11%	46 14%
13	14 24%	13 33%	16 28%	15 28%	11 23%	18 22%	87 26%
14	19 32%	13 33%	16 28%	15 28%	14 29%	40 49%	117 35%
15	13 22%	5 13%	7 12%	8 15%	4 8%	6 7%	43 13%
16	2 3%	3 8%	1 2%	2 4%		1 1%	9 3%
+ 16	2 3%	1 2.5%	4 7%	1 2%	3 6%	4 5%	15 4%
No regla	2 3%		3 5%		6 12%	4 5%	15 4%
Total	59	39	56	53	48	82	337

Edad primer embarazo

Nota: Los porcentajes están sobre las mujeres que han tenido embarazo. Las que nunca se han embarazado está sacado sobre el total.

Edad 1er embarazo	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	palcilas	Jucuapa Centro	Total
-18 años	26 63%	19 50%	30 61%	23 55%	16 52%	29 49%	143 55%
18	4 10%	5 16%	8 16%	2 5%	2 6%	8 13%	29 11%
19-20	5 12%	8 21%	7 14%	12 28%	6 19%	6 10%	31 12%
21-25	6 15%	6 16%	3 6%	4 9%	6 19%	6 10%	31 12%
+ 25			1 2%	1 2%	2 6%	2 3%	6 2%
Nunca	18 30%	1 2.5%	7 14%	11 21%	17 35%	23 35%	77 23%
Total	41 de 59	38 de 56	49 de 56	42 de 53	31 de 48	59 de 82	260 de 337

Espacio de primer regla y el primer embarazo

Nota: El porcentaje es sobre las mujeres embarazadas.

Espacio	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasanos	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
1 2 año	2 5%	1 3%	0	0	2	0	5
1 año	4 10%	2 5%	12 24%	4	4 3%	5	31 12%
2 años	10 24%	4 10%	10 20%	8 19%	3 10%	10 17%	45 17%
3 años	11 27%	10 26%	7 14%	7 17%	7 22%	12 20%	54 21%
4 años	2 5%	6 16%	7 14%	9 21%	2	13 22%	39 15%
5 años	3 %	4 0.5%	5	2	4 13%	3	21 8%
6 años	4 0%	3 8%	3	4	2	5	21 8%
7 años	1 2%	2 5%	1	4	2	3	13 5%
8 años	2 5%	3 8%	1	1	1	3	11 4%
9 años	0	1 3%	1	1	0	2	5
10 años	1 2%	1 3%	1	0	1	1	5
12 años					1	1	2
13 años	1 2%	1 %	1	2	2	1	8
No emba.	18	1 3%	7	11	17	23	77 23%

El 55% de las mujeres tuvieron el primer embarazo antes de los 18 años y el 86% antes de los 20

Número de embarazos

	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
# mujeres	41	38	49	42	31	59	260
# más de 5 hij@s	25 61%	18 47%	21 43%	17 40%	16 52%	34 58%	131 50%
Menos de 5 hij@s	16 39%	20 52%	28 57%	25 59%	15 48%	25 42%	129 50%
Hij@s/viv@	199	165	206	182	124	244	1120
Embarazo actual	6	3	5	7	3	6	30
Hij@s muert@s	49	20	34	22	25	69	219
Abortos	18	11	23	19	14	19	104
Total/emb	271 6.6 Ex♀	196 5.1Ex♀	266 5.4 Ex♀	229 4.3 Ex♀	166 3.4 Ex♀	335 4.6 Ex♀	1463 5.6 Ex♀

El total de embarazos es partos + abortos + embarazo actual. Hay que tomar encuesta los partos gemelares por eso no coincide los hijos vivos + hijos muertos + abortos + embarazo actual. En Jucuapa Abajo 1 parto gemelar, Bijague 3 , Aranjuez 2, Matasano 1 y Jucuapa Centro 3.

El 50% de las mujeres entrevistadas tenían más de 5 cinco embarazos.

El 7.1% de los embarazos terminaron en abortos.

De los 219 hijas/os muertos 24(11%) fueron óbito.

De los 1315 nacidos vivos han muerto 195 (15%).

Causa de muerte de las hijas/os

Causa	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
Fiebre	14	4	2	2	1	1	24
Sarampión	2	1	2			1	6
EDA	5	3	5	2		1	16
Enfermedad	19		4	13	13	45	94
Dolor	1						1
Epilepsia	1						1
Óbito	1	2	8	3	2		24
Moto	3	1				8	3
Chifladora	1	1					4
BNM	1	2	6		2	2	13
DN	1	1				2	3
Gemelar		1	3			1	9
Pretérmino		1				4	2
Asma		1		1		1	2
Malformación		1	1		2		4
Vómito		1			1		2
Polio					1		1
RN			1		2		3
Desaparecido			2		1		3
Pujo				1			1
Anemia						1	1
M. Materna						1	1
Tumor						1	1
Total	49	20	34	22	25	69	219

La causa más frecuente expresada por las mujeres es "enfermedad) cuando dan un diagnostico mas detallado lo mas frecuente es la fiebre ,diarrea, bronconeumonía.

Lugar de los partos

Lugar	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa centro	Total
Casa	243* 98%	158* 87%	175* 73.5%	173* 85%	95 64%	284 92%	1128 84%
Hospital	4 2%	23 13%	63 26%	30 15%	43 29%	26 8%	189 14%
Materna	0	1 0.5%	0	0	11 sin d	0	1 ONG
Total	247	182	238	203	149	310	1329

*son los partos gemelares

Jucuapa Abajo 1, Bijague 3, Aranjuez 2, Matasano 1, Jucuapa Centro 3

El 84% de los partos de las mujeres entrevistadas fueron atendidos en domicilio

Quién la atendió

Atendido por	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
Parteras	109 44%	137 75%	121 51%	114 56%	85 57%	245 79%	811 61%
Familiar	103 41.5%	13 7%	42 18%	32 16%		17 5%	207 15.5%
Personal de salud	4 2%	24 13%	63 26%	30 15%	43 29%	26 8%	190 14%
Solas	31 12.5%	8 4%	12 5%	27 13%	10 7%	22 7%	110 8%
total	247	182	238	203	138+1 1s/d		1318 +11/ sd

El 61% de los partos de las mujeres entrevistadas fueron atendidos por parteras

Uso de métodos anticonceptivos

Método	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa centro	Total
no	50 85%	18 46%	33 59%	27 51%	30 62%	49 60%	207 61%
si	9 15%	21 54%	23 41%	26 49%	18 37 %	33 40%	130 38%
G.O	6	10	9	9	8	19	61 47%
Est.Q	2	3	5	4	5	7	26
Inyección	1	2	2	5	2	2	14 11%
condón	0	4	2	7	2	2	17 13%
DIU	0	1	5	1	1	3	11 8%
Otros	0	1	0	0	0	0	1
Total	9	21	23	26	18	33	130

El 61% de las mujeres entrevistadas no usan ningún método anticonceptivo

De las que usan algún tipo de método, el más usado son los géstasenos orales, seguido de la esterilización quirúrgica.

Jucuapa Abajo

Las dos esterilizadas quirúrgicamente, antes no planificaban: 1 por el marido, 1 no contesta. De las 6 embarazadas actualmente: 2 planificaban antes, 1 con G.O y una con depoprovera; 4 no planificaban (1 por descuido, 2 no le gusta al marido, 1 no le gusta a ella)

Bijague

De las tres esterilizadas quirúrgicamente, antes 1 no planificaba y de dos no se sabe. De las tres embarazadas actualmente, 2 planificaban antes con G.O, 1 no planifica porque le hacen daño.

Palcilas

De las cinco esterilizadas quirúrgicamente: 2 planificaban antes con G.O, 1 nunca planificó, 2 no se sabe.

De las tres embarazadas, 1 no planificaba antes porque no les gusta y dos usaban G.O.

Matasanos

De las cuatro esterilizadas quirúrgicamente antes 2 planificaban ,1 con G.O y una con condón, 1 no planificaba antes y 1 no se sabe.

3 de las que no planifican, porque están solas, 2 antes usaban condones, 1 no le gusta a su marido.

De las 7 embarazadas, 3 planificaban antes, 1 con depoprovera, 2 con condones ,4 no planificaban, 1 no les gusta, 1 le hacen daño, 2 nunca.

Aranjuez

De las cinco esterilizadas quirúrgicamente, antes 2 no planificaban, 1 por que no quería y 1 por desconocimiento.

De las 5 embarazadas, 4 no planificaban, 3 no las deja el compañero, 1 no le gusta, 1 planificaba con depoprovera.

Jucuapa centro

De las siete esterilizadas quirúrgicamente, no tenemos dato si antes usaban método.

De las seis embarazadas, 5 no planificaban, 3 por que les gusta, 1 nunca, 1 es su primer embarazo, 1 planificaba con G.O.

Motivos expresados para no usar métodos de planificación

Motivo	Jucuapa Abajo	Bijague	Aranjuez	Matasano	Palcilas	Jucuapa Centro	Total
Miedo	5	0	1	0	0	1	7 3%
No gusta	7	2	2	2	2	7	22 10%
No había	3	1	1	1	0	6	12 6%
Más tarde	2	1	0	0	0	0	3
Está sola	15	5	7	14	17	19	77 37%
Descuido	1	0	0	0	0	0	1
Desconocimiento	1	0	0	0	0	0	1
Marido	4	2	3	0	0	1	10 5%
No hay necesidad	3	0	0	0	1	0	4 2%
No quiere	3	0	4	0	0	0	7 3%
Embarazo	6	3	5	7	3	6	30 14%
Es malo	0	1	0	0	0	0	1
Recién parida	0	3	1	0	0	0	4 2%
Caen mal	0		3	1	1	0	5
Nunca			6	2	5	6	19 9%
Quiere embarazo				0	1	3	4 2%
total	50	18	33	27	30	49	207

Los motivos expresados para no planificar soy muy variados, pero tienen que ver con la falta o mala información, y con la actitud de los compañeros que no quieren.

Análisis y conclusiones

- Un 10% de las entrevistadas están solas, frente al 69% que están casadas o acompañadas.
- El 62% de las entrevistadas son menores de 30 años y el 22% menores de 18, quiere decir que tiene posibilidades y probabilidades de seguir saliendo embarazadas.
- El 85% dice practicar la religión católica.
- El 55% han salido embarazadas antes de los 18 años y el 86% de las entrevistadas tuvieron su primer embarazo antes de los 20 años.
Es una de las manifestaciones del desconocimiento que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, los derechos reproductivos, y la fuerte presión social sobre el rol de la mujer asociado al rol de madre.
Además de la asociación de relación sexual con reproducción.
El 22.8% de las entrevistadas no han salido nunca embarazadas.
- En el 73% de las entrevistadas el espacio entre la primera regla y el primer embarazo es menor de 5 años.
- El promedio de embarazos por mujer es de 5.6 si solamente tomamos en cuenta las que alguna vez han estado embarazadas, si es entre todas las entrevistadas es de 4.3 embarazos por mujer.
- El 84.8% de los partos han sido atendidos en casa, frente al 14% en las unidades de salud.
- El 61% de los partos fueron atendidos por parteras, frente al 14% por personal de salud, 8.2% han sido partos solas, y 15.5% atendido por un familiar.
- El 38.5% de las entrevistadas usan algún método anticonceptivos en el momento de la entrevista, el 61% no usan métodos anticonceptivos.
- El método más usado son los G.O(47%) ,20% esterilización quirúrgica, 13% condón y 11% depoprovera.
- El motivo expresado de por qué no usa método, 37% por que están solas, 14% están actualmente embarazadas. Los otros motivos tienen relación con desconocimiento, miedos o el marido.